

CYSTENIUM® ЦИСТЕНИУМ® II

для защиты мочевыводящих путей

КАК РАЗВИВАЕТСЯ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЦИСТИТ?



Бактерия попадает в мочевой пузырь или мочевой тракт. В таком состоянии она еще не может навредить организму.



На поверхности стенки бактерии есть специальные реснички или жгутики – фимбрии (пили). Они вырабатывают специфический белок – адгезин.



Белок адгезин связывается с рецепторами на поверхности клеток, выстилающих мочевой пузырь.



Бактерия прикрепилась к слизистой! С этого момента она начинает выделять в клетки мочевого пузыря токсины, «забирать» из клеток полезные вещества и размножаться.



Клетки мочевого пузыря повреждаются и гибнут. Начинается цистит.

ЦИСТЕНИУМ II: ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ

Компоненты Цистениума II нарушают механизм «заселения» бактериями мочевого пузыря, и потому воздействуют непосредственно на причину развития цистита:



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЭКСТРАКТ КЛЮКВЫ EXOCYAN™

- Exocyan™ – это уникальный стандартизованный экстракт клюквы, который производит компания Nexiga в г. Бордо, Франция.
- Экстракт клюквы Exocyan™ стандартизирован по проантоцианидинам (уникальные технологии позволяют выделить из клюквы проантоцианидины А), которые доказанно уменьшают вероятность (риск) инфекций мочевыводящих путей.

Биологически активная добавка к пище «ЦИСТЕНИУМ II»

Не является лекарством.

СГР № RU.77.99.11.003.R.003791.10.19 от 16.10.2019 г.

ТУ 10.89.19-157-58693373-2019.

Форма выпуска: 14 таблеток для рассасывания массой

по 1800 мг.

Состав: лактоза моногидрат, D-манноза, экстракт плодов клюквы, аскорбиновая кислота (витамин C), антистикующие агенты – магний стеарат, кремния диоксид аморфный, носитель – стеариновая кислота.

ПРИЕМ 1–2 ТАБЛЕТОК ОБЕСПЕЧИТ ПОСТУПЛЕНИЕ:

Наименование компонента	Количество, мг	Дети, %		
		7–11 лет	11–14 лет	14–18 лет
Витамин С	60–120	100–200 ^{1*}	86–171 ^{1*} (м) 100–200 ^{1*} (д)	67–133 ^{1*} (м) 86–171 ^{1*} (д)
Проантоцианидины	36–72	–	–	–
D-манноза	450–900	–	–	–
Наименование компонента	Количество, мг	Женщины, %		
		Беременные (1-я половина) Беременные (2-я половина)		
Витамин С	60–120	67–133 ^{1*} 60–120 ^{1*}	50–100 ¹ 50–100 ¹	100–200 ^{2*}
Проантоцианидины	36–72	36–72 ³	36–72 ³	36–72 ³
D-манноза	450–900	–	–	–

Пищевая ценность в 1 таблетке: углеводы – 1,6 г.

Энергетическая ценность в 1 таблетке: 27 кДж / 6,4 ккал.

* – согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».
1* – % от рекомендованного уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 (Приложение 2).
2* – % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» (Приложение 3).
3* – не превышает верхний допустимый уровень потребления.
(м) – мальчики / (д) – девочки.

Рекомендации по применению: детям старше 7 лет и взрослым по 1 таблетке 1–2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 2 недели. При необходимости прием повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед применением детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Беременным и кормящим женщинам принимать по назначению и под наблюдением врача.

Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина С, содержащего проантоцианидины.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.

Реализация: через аптеки учреждения, специализированные магазины по продаже диетических продуктов, специальные отделы продовольственных магазинов.

Срок годности: 3 года.

Изготовитель: ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107.

Организация, уполномоченная на приемление претензий: АО «АКВИОН», РФ, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 8 этаж, помещение IN – комната 11, тел.: +7 (495) 780-72-34.

Все права на продукт принадлежат АО «АКВИОН».

КАК ПРИНИМАТЬ?



Детям старше 7 лет и взрослым по 1 таблетке 1–2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 2 недели. При необходимости прием повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед применением детьми необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Беременным и кормящим женщинам принимать по назначению и под наблюдением врача.

КОГДА ПРИНИМАТЬ?



Для большей эффективности один прием Цистениума II желательно запланировать на вечернее время, так как ночью моча застаивается и возникает благоприятная среда для размножения микроорганизмов.



Непосредственно после возникновения факторов риска можно провести один курс приема Цистениума II (2 недели). Если циститы повторяются, целесообразно принимать Цистениум II в течение более длительного времени.



Цистениум II совместим с антибактериальными препаратами и другими средствами для терапии цистита.

СОВЕТЫ ПО ПРИЕМУ**:

- Можно рассасывать таблетку, запивая водой или другим напитком (в том числе сладким).
- Если сложно рассосать таблетку, ее допустимо растолочь и растворить в половине стакана воды, а затем выпить полученный напиток. Можно подсладить по вкусу.
- Для удобства приема таблетку можно разделить на несколько частей, которые затем следует рассосать, разжевать или проглотить, запивая водой.
- Допустимо разжевать таблетку.

ЦИСТЕНИУМ II: ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ



Активные компоненты Цистениума II действуют на одну и ту же «мишень», что повышает эффективность защиты.



Эффективность не снижается при длительном приеме, так как у бактерий не формируется устойчивость (резистентность) к действию растительных компонентов.



Высокий профиль безопасности: можно принимать беременным женщинам и детям с 7 лет.



Не содержит ароматизаторов, красителей, консервантов, подсластителей.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ AKVION.SHOP



при помощи QR-кода и

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ!

Akvion.shop – это возможность приобретать продукцию напрямую от производителя на выгодных условиях.



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН AKVION.SHOP ЖДЕТ ВАС!

- Вся продукция всегда в наличии.
- Гарантия подлинности и качества.
- Накопительная система скидок и бонусов.

** Советы носят рекомендательный характер, не обязательны к исполнению.
Exocyan™ является товарным знаком компании Nexiga.

KZ

ТАҒАМҒА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПА «ЦИСТЕНИУМ II».

МТК № RU.77.99.11.003.R.003791.10.19 16.10.2019 ж.

бастап. ТШ 10.89.19-157-58693373-2019.

Шығарылыш түрі: салмағы 1800 мг соруға арналған

14 таблеткалар.

Құрамы: лактоза моногидраты, D-манноза, мукжидек жемісінің сыйындысы, аскорбин қышқылы (С дәрүмен), түйріштелеуге қарсы агенттер – магний стеараты, аморфты кремний диоксиді, тасымалдаушы – стеарин қышқылы.

1-2 ТАБЛЕТКАНЫ ҚАБЫЛДАУ КІРПІСТІ ҚАМТАМАСЫ ЕТЕДІ:

Компонент атауы	Саны, мг	Балалар, %	
	7–11 жас	11–14 жас	14–18 жас
С дәрүмен	60–120	100–200 ^{1*}	86–171 ^{1*} (ү)
		100–200 ^{1*} (к)	86–171 ^{1*} (к)
Проантоцианидиндер	36–72	–	–
D-манноза	450–900	–	–

Компонент атауы	Саны, мг	Әйелдер, %	Ересектер, %		
		Жүктілер (І жарты)	Жүктілер (ІІ жарты)	Емзетіндер	Ересектер
С дәрүмен	60–120	67–133 ^{1*}	60–120 ^{1*}	100–200 ^{2*}	
Проантоцианидиндер	36–72	36–72 ³	36–72 ³	36–72 ³	36–72 ³
D-манноза	450–900	–	–	–	–

Компонент атауы	Саны, мг	Әйелдер, %	Ересектер, %		
		Жүктілер (І жарты)	Жүктілер (ІІ жарты)	Емзетіндер	Ересектер
С дәрүмен	60–120	67–133 ^{1*}	60–120 ^{1*}	100–200 ^{2*}	
Проантоцианидиндер	36–72	36–72 ³	36–72 ³	36–72 ³	36–72 ³
D-манноза	450–900	–	–	–	–

1 дәрінің (таблетканың) тағамдық құндылығы: көмірсулар – 1,6 г.

1 дәрінің (таблетканың) энергетикалық құндылығы: 27 кДж / 6,4 ккал.

1* – % according to MP 2.3.1.2432-08 «Norms of Physiological Needs for Energy and Nutrients for Different Population Groups of the Russian Federation».

2* – % of recommended daily consumption according to TRCU 022/2011 (Appendix 2).

3* – % of recommended intake level according to the Uniform Sanitary Epidemiological and Hygienic Requirements for Products Subject to Sanitary and Epidemiological Supervision (Control) (Annex 5).

* – does not exceed the maximum permissible consumption level.

(b) – boys / (g) – girls.

1* – % according to MP 2.3.1.2432-08 «Norms of Physiological Needs for Energy and Nutrients for Different Population Groups of the Russian Federation».

2* – % of recommended daily consumption according to TRCU 022/2011 (Appendix 2).

3* – % of recommended intake level according to the Uniform Sanitary Epidemiological and Hygienic Requirements for Products Subject to Sanitary and Epidemiological Supervision (Control) (Annex 5).

* – does not exceed the maximum permissible consumption level.

(b) – boys / (g) – girls.

1* – % according to MP 2.3.1.2432-08 «Norms of Physiological Needs for Energy and Nutrients for Different Population Groups of the Russian Federation».

2* – % of recommended daily consumption according to TRCU 022/2011 (Appendix 2).

3* – % of recommended intake level according to the Uniform Sanitary Epidemiological and Hygienic Requirements for Products Subject to Sanitary and Epidemiological Supervision (Control) (Annex 5).

* – does not exceed the maximum permissible consumption level.

</div