

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Дышесол****Регистрационный номер:** ЛП-007106**Торговое наименование:** Дышесол**Международное непатентованное или группировочное наименование:** не присвоено**Лекарственная форма:** капли назальные**Состав****10 г препарата (флакон) содержат:***Активные компоненты*

Сосны обыкновенной хвои масло – 0,3752 г

(Сосны обыкновенной масло)

Витамин Е (dl-альфа-Токоферола ацетат; Витамин Е-ацетат) – 0,1700 г

Мяты перечной листьев масло – 0,1000 г

(Мяты перечной масло)

Эвкалипта листьев масло – 0,0500 г

(Эвкалиптовое масло)

Тимол – 0,0032 г

Гвайазулен – 0,0020 г

Вспомогательные вещества

Олеилмакроглицериды / Олеилполиоксил-глицериды – 1,0000 г

(Лабрафил М-1944-СS)

Бутилгидроксанизол – 0,0012 г

Подсолнечное масло (масло подсолнечное) – 8,2984 г

Описание

Прозрачная жидкость от синего до синего с зеленоватым оттенком цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Противоконгестивное средство растительного происхождения.

Код АТХ

R01AX30.

Фармакологические свойства**Фармакодинамика**

Оказывает противовоспалительное и антисептическое действие.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Острый ринит, хронический атрофический ринит; острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся сухостью слизистых оболочек носа; состояния после оперативного вмешательства в полости носа – по назначению врача (в условиях стационара и амбулаторно).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, аллергический ринит, детский возраст до 2 лет.

С осторожностью

Предшествующие операции на полости носа.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания.

Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Местно. Взрослым препарат закапывают в первый день по 1-2 капли в каждый носовой ход с интервалами в 1-2 часа. В последующие дни по 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки. Детям закапывают по 1-2 капли 3-4 раза в день или используют ватный тампон.

Возможно применение препарата для ингаляций, для этого 2 мл (50 капель) закапывают в ингалятор.

Ингаляции рекомендуется проводить 2-3 раза в день. Длительность лечения 5-7 дней. Увеличение продолжительности или проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с лечащим врачом.

*Если после лечения улучшение не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.***Побочное действие**

Классификация частоты развития побочных эффектов приведена на основании системно-органных классов MedDRA (Медицинский терминологический словарь для регуляторной деятельности):

Очень часто ($\geq 1/10$);Часто ($\geq 1/100$, но $< 1/10$);Нечасто ($\geq 1/1000$, но $< 1/100$);Редко ($\geq 1/10000$, но $< 1/1000$);Очень редко ($< 1/10000$);

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Общие расстройства и нарушения в месте введения

Частота неизвестна – зуд, жжение, сухость, гиперемия или отек слизистой оболочки носа.

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения

Частота неизвестна – дискомфорт в носу.

Нарушения со стороны иммунной системы

Частота неизвестна – гиперчувствительность к лекарственному препарату.

*Если любые из указанных в инструкции побочных действий усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.***Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В настоящее время данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Особые указания

Необходимо избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз.

Частое и/или длительное применение лекарственного препарата может привести к сухости слизистой оболочки носа. При состояниях послеоперационного вмешательства в полости носа препарат применяют только по назначению врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Капли назальные.

По 10 мл во флаконы темного стекла, закупоренные колпачками с контролем первого вскрытия с дозирующей пипеткой.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (флакон в пачке картонной) при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., Серпуховский муниципальный район, городское поселение Оболенск, район рабочего поселка Оболенск, шоссе Оболенское, стр. 20.

Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителя

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., Серпуховский район, рабочий пос. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.